

胃癌

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐性リスク
CapeOX (Cape+L-OHP)	L-OHP Cape	オキサリプラチン カベシタピン	130mg/m ² 100mg/m ² /回	点滴 経口	2時間 1日2回	d1 d1-14	21日	中等度
CapeOX+Nivo	上記 Nivo	ニボルマブ	360mg/回	点滴	30分	d1	21日	中等度
CapeOX+Tmab	上記 T-mab	トラスツズマブ	初回8mg/kg、 維持6mg/kg	点滴	90⇒30分	d1	21日	中等度
CapeOX +Zolbetuximab	上記 Zolbe	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m ² 2回目以降600mg/m ²	点滴	2時間以上	d1	21日	高度
CPT-11	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	d1.15	28日	中等度
DOC+S-1(術後)	DOC	ドセタキセル	40mg/m ²	点滴	60分	d1(2-7コース)	14日	軽度
	S-1	テガフル・キメラシル・ オテラシル	40～60mg/回	経口	1日2回	d1-14(1-7コース)		
	S-1	テガフル・キメラシル・ オテラシル	40～60mg/回	経口	1日2回	d1-28(8コース以降)		
mFOLFOX6	L-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	14日	中等度
	1-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	15分	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	d1-3		
mFOLFOX6+Nivo	上記 Nivo	ニボルマブ	240mg/回	点滴	30分	d1	14日	中等度
mFOLFOX6 +Zolbetuximab	上記 Zolbe	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m ² 2回目以降400mg/m ²	点滴	2時間以上	d1	14日	高度
G-SOX (S-1+L-OHP)	L-OHP	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴	2時間	d1	21日	中等度
	S-1	テガフル・キメラシル・ オテラシル	40～60mg/回	経口	1日2回	d1-14		
G-SOX+Nivo	上記 Nivo	ニボルマブ	360mg/回	点滴	30分	d1	21日	中等度
G-SOX+Tmab	上記 T-mab	トラスツズマブ	初回8mg/kg、 維持6mg/kg	点滴	90⇒30分	d1	21日	中等度
	上記 Zolbe	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m ² 2回目以降600mg/m ²	点滴	2時間以上	d1		
Pembrolizumab単剤(3週 毎 or 6週毎)	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/回	点滴	30分	d1	21日	最小度
	Pembro	ペムブロリズマブ	400mg/回	点滴	30分	d1		
Nivolumab単剤(2週毎 or 4週毎)	Nivo	ニボルマブ	240mg/回	点滴	30分	d1	14日	最小度
	Nivo	ニボルマブ	480mg/回	点滴	30分	d1		
nab-PTX±RAM	nab-PTX	nab/パクリタキセル	100mg/m ²	点滴	30分	d1・8・15	28日	軽度
	RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60⇒30分	d1・15		
weekly PTX±RAM	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	d1・8・15	28日	軽度
	RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60⇒30分	d1・15		
エンハーツ(T-DXd)単剤	T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴	90⇒30分	d1	21日	高度