

膵癌

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐性リスク
FOLFIRINOX	L-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	14日	高度
	1-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1		
	CPT-11	イリノテカン	180mg/m ²	点滴	90分	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	15分	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	d1-3		
mFOLFIRINOX	L-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	14日	高度
	1-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1		
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	d1-3		
GEM単剤	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1・8・15	28日	軽度
GS療法	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1・8	21日	中等度
	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	40mg/回	経口	1日2回	d1-14		
GnP療法	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1・8・15	28日	中等度
	nab-PAC	nabパクリタキセル	125mg/m ²	点滴	30分	d1・8・15		
Nal-IRI+5FU/1-LV	Nal-IRI	リボソームイリノテカン	70mg/m ²	点滴	90分	d1	14日	中等度
	1-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	d1-3		