

## 胆道癌

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐性リスク
GEM単剤	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8・15	28日	軽度
GC療法	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8	21日	中等度
	CDDP	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1・8		
GC療法 +Durva	上記 Durva	デュルバルマブ	1500mg/回	点滴	60分	d1	21日	中等度
GC療法 +Pembro	上記 Pembro	ペムプロリズマブ	200mg/回	点滴	30分	d1	21日	中等度
GS療法	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8	21日	中等度
	S-1	テガフル・キメラシル ・オテラシル	30～50mg/回	経口	1日2回	d1-14		
GCS療法	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1	14日	中等度
	CDDP	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1		
	S-1	テガフル・キメラシル ・オテラシル	40～60mg/回	経口	1日2回	d1-7		