

卵巣がん

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐性リスク
BV維持療法	BV	ベナビズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	21日	最小度
BV+Olaparib	BV Olaparib	ベナビズマブ オラパリブ	15mg/kg 300mg/回	点滴 経口	90⇒60⇒30分 1日2回	d1(最長15ヵ月) 連日(最長2年)	21日	最小度
CPT-11単剤	CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	点滴	90分	d1.8.15	28日	中等度
DC±BV	DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴	60分	d1	21日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
	BV	ベナビズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
Dose-dense TC	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	d1.8.15	21日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5-6	点滴	60分	d1		
GC±BV	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1・8	21日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC4	点滴	60分	d1		
	BV	ベナビズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
PLD-C±BV	PLD	リボゾーマルドキソルピシシ	30mg/m ²	点滴	90分	d1	28日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
	BV	ベナビズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
TC±BV	PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	3時間	d1	21日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
	BV	ベナビズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
NGT±BV	NGT	ノギテカン	1.25mg/m ²	点滴	30分	d1-5	21日	軽度
	BV	ベナビズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
NGT(Topotecan)	NGT	ノギテカン	1.5mg/m ²	点滴	30分	d1-5	21日	軽度
Weekly TC±BV	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	d1.8.15	28日	中等度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC2	点滴	60分	d1.8.15		
	BV	ベナビズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
BEP (胚細胞腫瘍、 性索間質性腫瘍)	BLM	ブレオマイシン	30mg/body	点滴	30分	d1.8.15	21日	高度
	ETP	エトポシド	100mg/m ²	点滴	60分	d1-5		
	CDDP	シスプラチン	20mg/m ²	点滴	60分	d1-5		