

子宮体癌

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐性リスク
AP	DXR	ドキシソルビシン	60mg/m ²	点滴	10分	d1	21日	高度
	CDDP	シスプラチン	50mg/m ²	点滴	60分	d1		
DC	DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴	60分	d1	21日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
DXR単剤	DXR	ドキシソルビシン	60mg/m ²	点滴	10分	d1	21日	高度
Pembrolizumab ±レンビバ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/回	点滴	30分	d1	21日	最小度
	Pembro	ペムブロリズマブ	400mg/回	点滴	30分	d1	42日	
	Lenva	レンバチニブ	20mg/回	経口	1日1回	連日	—	
IP	IFM	イホスファミド	1500mg/m ²	点滴	2時間	d1-5	28日	高度
	CDDP	シスプラチン	20mg/m ²	点滴	2時間	d1-5		
TC	PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	3時間	d1	21日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
MTX単剤	MTX	メソトレキセート	50mg/m ²	筋肉注射	—	d1	21日	—
Weekly TC	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	d1.8.15	28日	中等度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC2	点滴	60分	d1.8.15		